



HIV - SIDA

PAGINA DE NURSING

HIV (virusul imunodeficienței umane) este un virus care cauzează la om sindromul imunodeficienței dobândite, SIDA. SIDA (sindromul imunodeficienței umane dobândite) este afecțiunea cronică provocată de HIV, care atacă și distruge progresiv sistemul imunitar al organismului.

Transmitere

1. pe cale sexuală



2. pe cale sangvină (transfuzia sângelui sau a produselor sangvine contaminate, utilizarea de seringi infectate)



3. pe cale transplacentară (de la mamă seropozitivă la copil)



4. în cursul alăptării materne.



Virusul HIV

paginadenursing.ro

distrugă globule albe – limfocitele T4 sau CD4 – care constituie baza imunității antiinfecțioase.

numărul de celule albe din organism scade treptat și, împreună cu acestea, scade și imunitatea.

organismul pierde capacitatea de rezistență chiar și în fața unei boli obișnuite.

Simptome initiale

- febră;
- durere de cap;
- dureri musculare și dureri articulare;
- dureri în gât;
- adenopatie
- diaree;
- pierdere în greutate;
- tuse;
- transpirații nocturne.



Simptome ulterioare

- frisoane
- adenopatie
- oboseală persistentă, inexplicabilă
- pierdere semnificativă în greutate, adesea însoțită de diaree, slăbiciune cronică și febră.
- afecțiuni ale creierului și ale sistemului nervos central.



Evoluție

- Infecția cu HIV

fereastra imunologică
4-14 săptămâni

- apar anticorpi specifici anti-HIV

primoinfecția

- apar simptome trecătoare

7 și 11 ani după seroconversie

- manifestări clinice de SIDA



ZIUA MONDIALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA HIV/SIDA

1 DECEMBRIE 2024



Institutul
Național de
Sănătate Publică



MINISTERUL
SĂNĂTĂȚII

***DREPTURILE OMULUI
SUNT PENTRU TOȚI,***

IAR SĂNĂTATEA

ESTE UN DREPT AL OMULUI!

Respectarea drepturilor omului este esențială
pentru a pune capăt **SIDA** ca amenințare
pentru sănătatea publică.



DE LA HIV LA SIDA



infectare cu
virusul HIV

nedetectat



depistare virus
HIV în sânge

fără tratament



SIDA

scăderea sistemului
imunitar



scăderea celulelor
 $CD4 < 200/mm^3$

SIMPTOME HIV ȘI SIDA

Primele simptome



Febră



Durere de cap



Oboseală



Noduli limfatici
lărgiți

Simptome ulterioare

- Ganglionii limfatici
- Letargie
- Pierdere în greutate
- Febră și transpirație
- Infecții permanente cu drojdie
- Erupții persistente
- Boli inflamatorii pelvine
- Pierderea memoriei pe termen scurt

TRANSMITERE HIV

Metode de transmitere HIV



transfuzie
sânge



droguri



sex
neprotejat



sarcină



instrumentar
nesteril

Nu influențează transmiterea



atingerea
mâinii



sărut



din apă



înțepături de
insecte



prin
măncare